

DOCTEUR ERIC BOUHANNA

Ancien Interne des hôpitaux de Paris
Ancien Chef de Clinique des hôpitaux de Paris
Praticien attaché à l'hôpital Saint-Louis
Microchirurgie

CHIRURGIE PLASTIQUE
RECONSTRUCTRICE ET ESTHÉTIQUE
14, Rue Théodore de Banville

75017 PARIS (M° Péreire)
Tel : 01 47 54 95 16

Email : docteurbouhanna@mac.com
Site : www.docteurbouhanna.org

Conv. Secteur 2 / 75 1 93666 7

IMPLANTS DE SOURCILS

Différentes causes peuvent être responsables d'une raréfaction de la pilosité de la région du sourcil (génétique, pelade, cicatrice suite à un traumatisme, brûlure....).

L'implantation de sourcils est une technique chirurgicale simple qui permet de densifier ou de recréer partiellement ou totalement la région du sourcil.

Le principe est de prélever une mini bandelette de cuir chevelu, les cheveux sont séparés les uns des autres afin d'obtenir des greffons d'un cheveu, puis ils sont implantés au niveau de la région du sourcil. Il faut environ une centaine de greffons pour redensifier un sourcil.

Il s'agit d'une intervention de chirurgie esthétique, qui n'est prise en charge ni par la sécurité sociale, ni par les mutuelles : l'ensemble des frais est à votre charge, et en particulier aucun arrêt de travail ne peut vous être prescrit. Si l'intervention est décidée, un devis vous sera remis par le chirurgien au cours de votre deuxième consultation.

Avant l'intervention :

- **Un délai minimum** de 15 jours est obligatoire entre la consultation de chirurgie et l'acte chirurgical.
- **Des photographies** médicales sont toujours réalisées.
- **Prévoyez une période d'indisponibilité professionnelle** après l'intervention, car aucun arrêt de travail ne pourra vous être prescrit. Selon les cas, cette période varie de 1 à 8 jours environ suivant l'importance de l'œdème post opératoire.
- Les consignes médicales systématiques les plus importantes sont les suivantes :
 - Faire un **shampooing antiseptique** le matin de l'intervention
 - Débuter traitement antibiotique la veille de l'intervention, il sera poursuivi 3 jours après.
 - Éviter la prise de café le matin de l'intervention

L'intervention

- L'intervention dure environ 1 h 30 à 3h00 suivant la quantité d'implants nécessaires.
- Elle est réalisée sous anesthésie locale pure.
- Vous n'avez pas besoin d'être à jeun.
- La première partie consiste à réaliser le prélèvement au niveau du cuir chevelu. La zone donneuse est suturée par un fils résorbable ou par des agrafes spéciales cuir chevelu.
- La deuxième partie consiste en l'implantation des greffons au niveau du sourcil.

Après l'intervention, vous restez en surveillance une heure dans votre chambre.
Prévoyez une personne pour votre retour à domicile ou bien nous vous réserverons le jour même un taxi.

Après l'intervention :

- Il n'y a aucun pansement
- Un oedème au niveau de la région greffée peut apparaître dans les 24 à 48 heures qui suivent

l'intervention. Celui-ci migre rapidement vers les paupières leur donnant un aspect gonflé pour disparaître au bout de 3 à 4 jours.

- Dans les 2 à 3 jours qui suivent l'intervention vont se former des petites croûtes sur chaque greffon. Celles-ci mettront environ 5 à 7 jours pour tomber.
- Les nouveaux cheveux implantés qui constituent le sourcil vont tomber pour la plupart avec les croûtes.
- La repousse s'effectue qu'à partir du 3^{ème} mois. La croissance du cheveu est alors d'environ 1 cm par mois.
- Contrairement au poils des sourcils, les cheveux implantés conservent leur croissance régulière, c'est pourquoi un entretien des sourcils par une coupe régulière est obligatoire.
- Dans les premiers mois, qui suivent l'intervention, il est conseillé d'utiliser un gel modelant afin que la repousse du sourcil se fasse harmonieusement.
- Des consultations de contrôle sont prévues 1 mois, 3 mois, 6 mois, et 1 an après l'intervention, comprenant un examen clinique et la réalisation de photographies numériques.
- 6 à 12 mois sont nécessaires pour juger du résultat de l'intervention.

Les risques :

Tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans les conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et à la réglementation en vigueur, expose à un risque de complication. Comme toute intervention chirurgicale, l'implantation des sourcils comporte des risques :

Les complications spécifiques de cette intervention sont les suivantes :

- **micro-abcès** peuvent survenir sur certains follicules implantés. Ces infections localisées sont rares et lorsqu'elles surviennent se traitent par des soins locaux et traitement antibiotique.
- **Insuffisances de résultat, ou asymétries** : elles peuvent être liées à une mauvaise prise des greffons ou à une implantation insuffisante (manque de densité)
- Elargissement de la cicatrice au niveau du prélèvement du cuir chevelu. En cas de gêne une retouche de la cicatrice est possible sous anesthésie locale.